

Halüsinojen Kullanımına Bağlı Bozukluklar

En bilinen ve en yaygın kullanılan halüsinojen LSD (liserjik asit dietilamid) ya da halk arasında asit olarak bilinen maddedir. Diğerleri meskalin, psilosibin, gibi birbirinden yapıca çok farklı, fakat aynı etkiye yol açan maddelerdir.

Halüsinojen kullanımını takiben belirgin bir şekilde davranışsal veya psikolojik değişiklikler görülür. Bunlar arasında anksiyete, depresyon, aklını kaybedeceği korkusu, paranoid düşünceler, yargılama bozukluğu ve algı bozuklukları sayılabilir. Çarpıntı, terleme, görme bulanıklığı, el titremesi gibi belirtiler de ortaya çıkabilir.

Halüsinojen kullanımına bağlı kalıcı algı bozukluğu (flashback): Halüsinojenlerle ortaya çıkan kalıcı algı bozukluğunun özelliği, daha önce halüsinojen kullanımı ile ortaya çıkan etkilerin anımsanması şeklinde görülen algı bozukluklarının yeniden ortaya çıkmasıdır. Yani madde alınmadığı halde madde etkilerinin yeniden yaşanması durumudur. Bunlar genellikle rahatsız eder yada korkutur. Klinik açıdan sıkıntıya ya da toplumsal, mesleki alanlarda ya da diğer işlevsellik alanlarında bozulmaya neden olur. Ortaya çıkan bu anormal algılar epizodik olur, karanlık bir ortamda bulunmak, bunları düşünmek, anksiyete, yorgunluk ya da stresle tetiklenebilir.

Halüsinojen kullanımına bağlı psikotik bozukluk, duygudurum bozukluğu, anksiyete bozukluğu görülebilir.

Halüsinojen bağımlılığı tedavisi diğer madde bağımlılıkları tedavileri ile aynı ilkelerle yürütülür.